

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR**Itraconazol Slavia 100 mg capsule**
Itraconazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Itraconazol Slavia 100 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Itraconazol Slavia 100 mg
3. Cum să utilizați Itraconazol Slavia 100 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Itraconazol Slavia 100 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Itraconazol Slavia 100 mg și pentru ce se utilizează

- Afecțiuni ginecologice: candidoză vulvovaginală;
- Afecțiuni dermatologice și oftalmologice: pitiriasis versicolor, dermatomicoze, keratite fungice și candidoze orale, onicomicoze cauzate de dermatofiți sau levuri;
- Micoze sistemice: aspergiloze și candidoze sistemice, criptococoze (incluzând meningită cu criptococcus), histoplasmoze, sporotrichoze, paracoccidiodomicoze, blastomicoze și alte tipuri rare de micoze sistemice sau tropicale.

2. Ce trebuie să știți înainte de a utiliza Itraconazol Slavia 100 mg**Nu utilizați Itraconazol Slavia 100 mg dacă:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la itraconazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate mai jos la pct. 6);
- dacă sunteți însărcinată, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră v-a spus să-l utilizați (vezi “ Sarcina, alăptarea și fertilitatea” mai jos);
- dacă sunteți la vârsta fertilă și puteți rămâne însărcinată, trebuie să luați măsuri adecvate de contracepție pentru a vă asigura că nu rămâneți gravidă în timp ce luați acest medicament.
- deoarece Itraconazol Slavia 100 mg rămâne în organism o perioadă de timp după întreruperea tratamentului, trebuie să continuați utilizarea măsurilor contraceptive până la următorul ciclu menstrual ulterior încheierii tratamentului cu Itraconazol Slavia 100 mg.
- dacă aveți o afecțiune numită insuficiență cardiacă (de asemenea, denumită și insuficiență cardiacă congestivă sau ICC), Itraconazol Slavia 100 mg o poate agrava. În cazul în care medicul dumneavoastră decide că trebuie să luați Itraconazol Slavia 100 mg chiar dacă aveți această afecțiune, asigurați-vă că vă adresați imediat pentru consult medical în cazul în care prezentați dificultăți de respirație, creștere bruscă în greutate, umflarea membrelor, oboseală neobișnuită sau trezirea din somn în timpul nopții.

Nu utilizați acest medicament în cazul în care oricare dintre cele de mai sus vi se aplică. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Itraconazol Slavia 100 mg.

De asemenea, nu utilizați anumite medicamente în cazul în care luați Itraconazol Slavia 100 mg. Multe medicamente interacționează cu Itraconazol Slavia 100 mg. Vă rugăm citiți punctul “ Ce trebuie să știți înainte să utilizați Itraconazol Slavia 100 mg”, subpunctul “Itraconazol Slavia 100 mg împreună cu alte medicamente”.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Itraconazol Slavia 100 mg adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați orice alte medicamente, deoarece administrarea concomitentă a unor medicamente vă poate face rău.

- Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o afecțiune hepatică. Poate fi necesară ajustarea dozei de Itraconazol Slavia 100 mg.
- Nu mai luați Itraconazol Slavia 100 mg și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă apar următoarele simptome în cursul tratamentului: pierderea poftei de mâncare, greață, vărsături, oboseală, dureri abdominale, îngălbenirea pielii și a albului ochilor, scaune decolorate (mișcări intestinale) sau urină foarte închisă la culoare. Dacă trebuie să luați Itraconazol Slavia 100 mg, medicul dumneavoastră ar putea să solicite analiza regulată a sângelui. Motivul pentru această verificare este de a evidenția la timp afecțiunile hepatice, din moment ce aceste afecțiuni apar foarte rar.
- Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți afecțiuni cardiace. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți dificultăți de respirație, creștere bruscă în greutate, umflarea membrelor, oboseală neobișnuită sau trezirea din somn în timpul nopții, deoarece acestea pot fi semne de insuficiență cardiacă.
- Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o afecțiune renală. Poate fi necesară ajustarea dozei de Itraconazol Slavia 100 mg.
- Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau adresați-vă unui serviciu de gardă dacă aveți o reacție alergică severă (caracterizată prin erupție cutanată tranzitorie semnificativă, mâncărimi, urticarie, dificultăți de respirație, și/sau umflarea feței) în timp ce luați Itraconazol Slavia 100 mg.
- Nu mai luați Itraconazol Slavia 100 mg și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă deveniți sensibil la lumină.
- Nu mai luați Itraconazol Slavia 100 mg și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă prezentați afecțiuni severe ale pielii precum răspândirea erupției cutanate, însoțită de descuamarea pielii și vezicule la nivelul cavității bucale, al ochilor sau zonei genitale sau erupție cutanată cu mici pustule sau vezicule.
- Nu mai luați Itraconazol Slavia 100 mg și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă prezentați orice senzație de furnicăături, sensibilitate diminuată sau senzație de slăbiciune la nivelul membrelor sau alte probleme ale nervilor de la nivelul mâinilor sau picioarelor.
- Dacă în trecut ați prezentat o reacție alergică la un alt medicament antifungic, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră.
- Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți un pacient cu neutropenie, SIDA sau transplant de organ. Doza de Itraconazol Slavia 100 mg poate fi adaptată.
- Nu mai luați Itraconazol Slavia 100 mg și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă prezentați simptome de pierdere a auzului. În cazuri foarte rare, pacienții care iau itraconazol au raportat pierdere temporară sau permanentă a auzului.
- Spuneți medicului dumneavoastră dacă vederea vi se încețoșează sau dacă vedeți dublu, dacă auziți țiuitori în urechi, dacă pierdeți capacitatea de control a micțiunii sau urinați mai des decât de obicei.

Itraconazol Slavia 100 mg împreună cu alte medicamente:

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. În special, anumite medicamente nu trebuie luate în același timp, iar dacă anumite medicamente sunt luate în același timp, trebuie făcute niște modificări (de exemplu, schimbarea dozei).

Medicamente care nu trebuie luate în timp ce utilizați Itraconazol Slavia 100 mg, precum:

- anumite medicamente pentru alergii: terfenadină, astemizol și mizolastină;
- anumite medicamente utilizate pentru a trata angina (durere foarte mare în piept) și tensiunea arterială crescută: bepridil, felodipină, nisoldipină, lercanidipină, ivabradină, ranolazina, eplerenonă;
- cisapridă - pentru probleme digestive;
- anumite medicamente care scad colesterolul: simvastatina, lovastatina;
- anumite medicamente pentru somn: midazolam (oral), triazolam;
- anumite medicamente utilizate pentru afecțiuni psihotice: lurasidonă, pimozidă, sertindol;
- colchicină, un medicament pentru tratamentul gutei, atunci când este utilizat la pacienți cu insuficiență renală sau hepatică;
- anumite medicamente pentru tratamentul durerilor severe sau pentru gestionarea dependenței: levacetilmetadol (levometadil), metadonă;
- halofantrină, un medicament pentru tratamentul malariei;
- irinotecan, un medicament pentru tratamentul cancerului;
- medicamente numite alcaloizi de ergotamină: dihidroergotamină sau ergotamină utilizate în tratamentul migrenelor;
- medicamente numite alcaloizi de ergotamină: ergometrină (ergonovină) sau metilergometrină (metilergonovină) utilizate pentru controlul sângerărilor și menținerea contracției uterine după nașterea copilului;
- anumite medicamente pentru tratarea ritmului neregulat al bățailor inimii: disopiramida, dronedarona, chinidina și dofetilida.

Așteptați cel puțin 2 săptămâni după întreruperea tratamentului cu Itraconazol Slavia 100 mg înainte de a lua oricare dintre aceste medicamente.

Medicamente care pot scădea acțiunea Itraconazol Slavia 100 mg precum:

- medicamente utilizate în tratamentul epilepsiei: carbamazepină, fenitoină, fenobarbital;
- medicamente pentru tratamentul tuberculozei: rifampicină, rifabutină, izoniazidă;
- medicamente pentru tratamentul HIV/SIDA: efavirenz, nevirapină.

De aceea, spuneți întotdeauna medicului dumneavoastră dacă utilizați oricare dintre aceste medicamente, pentru a putea fi luate măsurile corespunzătoare.

Așteptați cel puțin 2 săptămâni după ce întrerupeți tratamentul cu aceste medicamente, înainte de a lua Itraconazol Slavia 100 mg.

Medicamente care nu sunt recomandate, cu excepția cazurilor în care medicul le consideră necesare, precum:

- anumite medicamente folosite în tratamentul cancerului și anume: dasatinib, nilotinib, trabectedină;
- aliskiren, un medicament pentru tratamentul hipertensiunii arteriale;
- rifabutină, un medicament pentru tratamentul tuberculozei;
- carbamazepină, un medicament pentru tratamentul epilepsiei;
- colchicina, un medicament pentru tratamentul gutei;
- everolimus, un medicament care se administrează după transplantul de organ;
- fentanil, un medicament puternic folosit pentru tratamentul durerii;
- rivaroxaban, un medicament care încetinește coagularea sângelui;
- salmeterol, un medicament pentru îmbunătățirea respirației;
- tamsulosin, un medicament folosit pentru tratamentul incontinenței urinare la bărbați;
- vardenafil, un medicament pentru tratamentul disfuncției erectile.

Așteptați cel puțin 2 săptămâni după ce întrerupeți tratamentul cu Itraconazol Slavia 100 mg înainte de a începe tratamentul cu aceste medicamente, cu excepția cazurilor în care medicul consideră că este necesar să le luați.

Medicamente care ar putea necesita modificarea dozei (fie pentru Itraconazol Slavia 100 mg, fie pentru alte medicamente), precum:

- anumite medicamente: ciprofloxacină, claritromicină, eritromicină;
- anumite medicamente care acționează asupra inimii sau a vaselor de sânge: digoxina, nadolol, anumite medicamente blocante ale canalelor de calciu, inclusiv verapamil;
- medicamente care încetinesc coagularea sângelui: cumarine, cilostazol, dabigatran;

- metilprednisolon, budesonid, ciclesonida, fluticazona sau dexametazona (medicamente administrate pe cale orală, prin injecție sau inhalare pentru afecțiuni precum inflamațiile, astmul bronșic sau alergiile);
- ciclosporina, tacrolimus, temsirolimus sau rapamicina (de asemenea, numită și sirolimus), care se administrează de obicei după transplantul de organ;
- anumite medicamente utilizate pentru tratamentul HIV/SIDA: maraviroc și inhibitori de protează: indinavir, ritonavir, darunavir potențat cu ritonavir, fosamprenavir potențat cu ritonavir, saquinavir;
- anumite medicamente utilizate în tratamentul cancerului: bortezomib, busulfan, docetaxel, erlotinib, ixabepilonă, lapatinib, trimetrexat, alcaloizi de vinca;
- anumite medicamente pentru anxietate sau pentru a vă ajuta să dormiți (tranchilizante): buspironă, perospironă, ramelteon, midazolam administrat intravenos, alprazolam, brotizolam;
- anumite medicamente puternice pentru tratamentul durerii: alfentanil, buprenorfină, oxicodonă;
- anumite medicamente pentru tratamentul diabetului: repaglinidă, saxagliptină;
- anumite medicamente pentru tratamentul psihozelor: aripiprazol, haloperidol, quetiapină, risperidonă;
- anumite medicamente pentru tratamentul greței și al vărsăturilor: aprepitant, domperidonă;
- anumite medicamente pentru tratamentul de control al vezicii urinare iritabile (hiperactivă): fesoterodină, imidafenacin, solifenacin, tolterodină;
- anumite medicamente pentru tratamentul disfuncției erectile: sildenafil, tadalafil;
- praziquantel, un medicament utilizat împotriva viermelui de gălbează și al teniei;
- ebastină, un medicament pentru alergii;
- reboxetină, un medicament utilizat pentru a trata depresia;
- atorvastatină, un medicament utilizat pentru scăderea colesterolului;
- meloxicam, un medicament pentru tratamentul inflamației articulațiilor și a durerii;
- cinacalcet, un medicament pentru a trata paratiroida hiperactivă;
- anumite medicamente pentru a trata nivelul scăzut al sodiului din sânge: mozavaptan, tolvaptan;
- alitretinoin (administrare orală), un medicament pentru tratamentul eczemei;
- eletriptan, un medicament utilizat pentru a trata migrena.

Dacă utilizați oricare dintre aceste medicamente, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur(ă), adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea:

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Nu utilizați Itraconazol Slavia 100 mg în timpul sarcinii.

Dacă sunteți la vârsta fertilă și intenționați să rămâneți gravidă, trebuie să luați măsurile de contracepție adecvate pentru a vă asigura că nu rămâneți gravidă în timp ce luați acest medicament. Având în vedere că Itraconazol Slavia 100 mg rămâne în organism o perioadă de timp după ce întrerupeți tratamentul, trebuie să utilizați în continuare o metodă de contracepție până la următorul ciclu menstrual (sângerare menstruală) după încheierea tratamentului cu Itraconazol Slavia 100 mg.

Alăptarea

Dacă alăptați, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua Itraconazol Slavia 100 mg; o cantitate foarte mică de itraconazol poate ajunge în laptele matern.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Itraconazol Slavia 100 mg poate provoca uneori amețelă, vedere încețoșată/dublă sau pierderea auzului. Dacă aveți aceste simptome nu conduceți sau folosiți vehicule sau utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Itraconazol Slavia 100 mg

Itraconazol Slavia 100 mg conține zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele zaharuri, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Itraconazol Slavia 100 mg conține Galben Amurg FCF (E 110), Ponceau 4R (E 124), p-hidroxibenzoat de metil și p-hidroxibenzoat de n-propil. Acestea pot provoca reacții alergice, chiar întârziate.

3. Cum să utilizați Itraconazol Slavia 100 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de administrare Itraconazol Slavia 100 mg

Luați întotdeauna Itraconazol Slavia 100 mg imediat după masă, deoarece acest lucru ajută organismul dumneavoastră să folosească acest medicament.

Înghițiți capsulele întregi cu o cantitate mică de apă.

Pentru a asigura o absorbție corectă în organism a medicamentului, este necesar ca aciditatea din stomac să fie suficientă. Din acest motiv, medicamentele care neutralizează acidul gastric nu trebuie luate cu minimum 1 oră înainte de administrarea Itraconazol Slavia 100 mg sau nu trebuie administrate mai repede de 2 ore după administrarea acestuia. Din același motiv, dacă utilizați medicamente care opresc producerea de acid în stomac, trebuie să luați Itraconazol Slavia 100 mg împreună cu o băutură nedietetică de tip cola.

Cât Itraconazol Slavia 100 mg trebuie să luați și pentru ce perioadă de timp, depinde de tipul de ciupercă și de locul infecției. Medicul dumneavoastră vă va spune ce trebuie să faceți.

Doze

Candidoză vaginală

2 capsule/zi - o singură zi

Dermatomicoză

Doza depinde de infecția dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va spune cum trebuie administrat:

2 capsule/zi timp de 7 zile sau

1 capsulă/zi timp de 15 zile sau

1 capsulă/zi timp de 30 zile

Tinea palmo-plantară

1 capsulă/zi timp de 30 de zile.

Pityriasis versicolor

2 capsule/zi timp de 7 zile.

Tinea corporis, tinea cruris

1 capsulă/zi timp de 15 zile.

Candidoză orofaringiană

1 capsulă pe zi timp de 15 zile.

Micoza unghiilor

2 capsule/zi timp de 3 luni.

Aspergiloză, criptocoză, histoplasmoză, profilaxia în neutropenie, asociat tratamentului SIDA

2 capsule/zi. Durata tratamentului va fi stabilită de medic în funcție de răspunsul la tratament.

Utilizarea la copii și vârstnici

Deoarece datele despre utilizarea itraconazol la vârstnici sau copii sunt limitate, utilizarea lui la aceste categorii de pacienți este recomandată numai dacă potențialele beneficii depășesc riscurile (vezi pct. 4.4).

Utilizarea la pacienții cu insuficiență renală

Poate fi luată în considerare o ajustare a dozei de către medic.

Dacă utilizați mai mult Itraconazol Slavia 100 mg decât trebuie

Dacă luați mai mult Itraconazol Slavia 100 mg decât v-a fost recomandat, imediat informați-vă medicul sau mergeți în camera de gardă a celui mai apropiat spital.

Informații pentru medic în cazul supradozajului

În eventualitatea supradozajului accidental, trebuie instituite măsuri de susținere.

Se poate lua în considerare administrarea de cărbune activat. Itraconazol nu poate fi eliminat prin hemodializă. Nu este disponibil niciun antidot specific.

Dacă uitați să utilizați Itraconazol Slavia 100 mg

Dacă uitați să vă luați capsulele, luați-le imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este aproape timpul pentru următoarele capsule, treceți peste capsulele uitate.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Itraconazol Slavia 100 mg

Continuați să luați Itraconazol Slavia 100 mg pentru atât timp cât medicul dumneavoastră v-a spus. Nu opriți tratamentul doar pentru că vă simțiți mai bine.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea de itraconazol:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- durere de cap,
- durere abdominală,
- greață.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- inflamația sinusurilor,
- inflamația mucoasei nazale,
- infecții ale căilor respiratorii superioare,
- reacții de hipersensibilitate,
- diaree,
- constipație,
- vărsături,
- digestie dificilă,
- gaze la intestine,
- tulburări ale funcției hepatice,
- erupții cutanate,
- erupții cutanate circumscrise însoțite sau nu de mâncărime,
- mâncărimea pielii,
- tulburări ale menstruației.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- scăderea numărului de leucocite,
- boala serului,
- umflarea feței, mâinilor și picioarelor,
- reacții alergice severe,
- creșterea trigliceridelor,
- scăderea sensibilității tactile,
- tulburări ale gustului,
- amorțeli sau furnicături în mâini și picioare,
- vedere dublă sau încețoșată,
- pierderea temporară sau permanentă a auzului,

- țiuțuri în urechi,
- activitate insuficientă a inimii,
- respirație dificilă,
- inflamația pancreasului,
- toxicitate hepatică,
- creșterea bilirubinei,
- reacții cutanate severe însoțite de ulceratii, durere, formare de vezicule,
- căderea părului, sensibilizarea pielii la expunerea la lumină,
- micționări frecvente.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Itraconazol Slavia 100 mg

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Itraconazol Slavia 100 mg

- Substanța activă este itraconazolul. O capsulă conține itraconazol 100 mg.
- Celelalte componente sunt:

Continutul capsulei: sfere de zahăr, hipromeloză tip 2910 (6cP), copolimer bazic de metacrilat butilat (Eudragit E 100);

Capsula: dioxid de titan (E 171), galben de chinolină (E 104), Galben amurg FCF (E 110), Albastru strălucitor FCF (E 133), Ponceau 4R (E 124), p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216), dioxid de siliciu coloidal anhidru, laurilsulfat de sodiu, acid acetic glacial, glicerol, gelatină.

Cum arată Itraconazol Slavia 100 mg și conținutul ambalajului

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 5 capsule.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

S.C. Slavia Pharm S.R.L.

B-dul Theodor Pallady nr. 44C, Sector 3, București, România

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

Data ultimei verificări a prospectului septembrie 2019.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.